



MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA

# Les quatre saisons du diabète

1



MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA

## COMITÉ SCIENTIFIQUE

**Dr Nader Habib**, MD, médecin de famille au GMF Samson à Laval et administrateur associé, président du comité scientifique

**Dr Richard Dumas**, MD, endocrinologue CISSS Laval, Directeur du Centre de recherches cliniques de Laval

**Dre Stavroula Christopoulos**, MD, Endocrinologue, Hôpital Général Juif, Professeure adjointe de clinique, Université McGill

**Dr Samuel Serfaty**, MD, Médecin de famille, Directeur médical au GMF Polyclinique Masson

**Dr Carl Fournier**, MD, Médecin de famille, Médecin responsable du GMF Cadillac

**Mme Nicole Parent**, Ph. D., Directrice générale, Médecins francophones du Canada

## Divulgation des biais et conflits d'intérêts (comité scientifique)

### Dr Nader Habib, MD

- Conférencier, modérateur, membre de comités consultatifs et comités scientifiques : Bausch Health, Otsuka, Pfizer, Lundbeck, Amgen, Bayer

### Dr Richard Dumas, MD

- Recherche clinique, conférencier ou consultant (depuis deux ans) : Novo Nordisk, Eli Lilly, Abbott, Astra Zeneca, Medtronic, Arrowhead, Janssen, Amgen, Dexcom

### Dre Stavroula Christopoulos, MD

- Comité aviseurs et conférencière : Eli Lilly, Merck, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Janssen, Amgen, Dexcom, Abbott, Sanofi

### Dr Samuel Serfaty, MD

- Aucun conflit

### Dr Carl Fournier, MD

- Aucun conflit

### Mme Nicole Parent, Ph. D.

- Directrice générale, Médecins francophones du Canada

Ce programme de formation a reçu un soutien financier d'Eli Lilly Canada, sous la forme d'une subvention à visée éducative sans restriction.

## Objectifs d'apprentissage

- Reconnaître l'importance du continuum de l'obésité au diabète à travers les âges;
- Identifier les comorbidités en lien avec le diabète et l'obésité ;
- Choisir les meilleures approches thérapeutiques, selon l'âge et le contexte clinique;
- Prescrire les traitements appropriés et recommandés par les lignes directrices canadiennes en diabète et obésité;
- Déterminer quel patient référer en spécialité.

## Voici la famille Ladouceur

Eugénie, 86 ans

Michel, 65 ans

Isabelle, 45 ans

Andréanne, 19 ans



5



MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA



**Isabelle, 45 ans:  
diabète type 2 de novo**

6

## CAS CLINIQUE : Isabelle, mère d'Andréanne, 45 ans

### Description sommaire



- › Consulte pour polyurie, polydipsie, fatigue
- › Médications : Aucune
- › TA = 134/80
- › IMC = 33
- › A1c : 7,8%

### Diagnostic :

- › Diabète de type 2 de novo
- › Dyslipidémie
- › Obésité

A1c : hémoglobine glyquée

7

## Q3. VRAI OU FAUX

### VRAI OU FAUX

- La durée du diabète peut avoir un impact sur la possibilité de rémission du diabète
- La rémission du diabète est définie comme une glycémie normale suite à la prise d'un GLP1
- Une perte de 5 % à 10 % du poids peut améliorer la sensibilité à l'insuline et la maîtrise de la glycémie
- Tous les agonistes GLP1 et GLP1-GIP ont une puissance semblable vis-à-vis de la perte de poids et la gestion glycémique

8

### Q3. VRAI OU FAUX

#### VRAI OU FAUX

La durée du diabète peut avoir un impact sur la possibilité de rémission du diabète

VRAI

La rémission du diabète est définie comme une glycémie normale suite à la prise d'un GLP1

FAUX

Une perte de 5 % à 10 % du poids peut améliorer la sensibilité à l'insuline et la maîtrise de la glycémie

VRAI

Tous les agonistes GLP1 et GLP1-GIP ont une puissance semblable vis-à-vis de la perte de poids et la gestion glycémique

FAUX

9

### Q4. Quel serait votre prochain geste clinique?



A

Référer Isabelle à une diététiste

B

Parler de la possibilité de rémission du diabète avec Isabelle

C

Ajouter de la metformine

D

Débuter un agoniste GLP-1/GIP ou agoniste du GLP-1

E

Demander la permission de parler de son poids

10

## Q4. Quel serait votre prochain geste clinique?



**A**

Référer Isabelle à une diététiste

**B**

Parler de la possibilité de rémission du diabète avec Isabelle

**C**

Ajouter de la metformine

**D**


Débuter un agoniste GLP-1/GIP ou agoniste du GLP-1

**E**

Demander la permission de parler de son poids

11


## Objectifs potentiels et approches pour le diabète de type 2



Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Working Group, Jin S, Bajaj HS, Brazeau A-S, Champagne J, MacDonald B, Mackay D, Reichert S, Vallis M, On behalf of the Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Steering Committee, Bajaj HS, Gilbert J, Houlden R, Kim J, MacDonald B, Mackay D, Mansell K, Rabi D, Sherifali D, Remission of Type 2 Diabetes: User's Guide, Canadian Journal of Diabetes (2022), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2022.10.005>.

12

## Racines pathologiques du diabète de type 2 : Métaphore horticole



## Modifications du mode de vie associées à des bienfaits dans les cas de DT2

### Alimentation

- Diminution de l'apport en glucides/aliments à faible indice glycémique privilégiés<sup>1</sup>
- Régime alimentaire équilibré à teneur réduite en calories et apport adéquat en micronutriments, en respectant le rythme circadien (c.-à-d. ne pas manger quand l'heure du coucher approche)<sup>2-11</sup>

### Activité physique

- Réduction du temps passé en position assise<sup>12-15</sup>
- Tranches d'exercice – petites périodes d'activité chaque fois que c'est possible<sup>16</sup>
- Activité physique après les repas<sup>17</sup>

Une amélioration du sommeil a également été associée à des bienfaits<sup>18-21</sup>

DT2, diabète de type 2.

1. D'après Sievenpiper JL, et al. *Can J Diabetes*. 2018; 42:S64–S79; 2. Patterson RE, et al. *Ann Rev Nutr*. 2017; 37(1):371-93; 3. Farshchi HR, et al. *Am J Clin Nutr*. 2005; 81(1):16-24; 4. Poggioigalle E, et al. *Metabolism*. 2018; 84:11-27; 5. Jamshed H, et al. *Nutrients*. 2019; 11:1234; 6. Peeke PM, et al. *Nutr Diabetes*. 2021; 11:6; 7. Oosterman JE, et al. *Endocrinology* 2020; 161:bqaa180; 8. Bonnet JP, et al. *Obesity (Silver Spring)* 2020; 28:1098-109; 9. Gu C, et al. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020; 105:2789–802; 10. Hutchison AT, et al. *Obesity (Silver Spring)*. 2019; 27:724–732; 11. Liu D, et al. *N Engl J Med*. 2022; 386:1495-504; 12. Dempsey PC, et al. *Diabetes Care*. 2016; 39:964–72; 13. Duvivier BM, et al. *Diabetologia*. 2016; 60:490–8; 14. Winkler EA, et al. *Med Sci Sports Exerc*. 2018; 50(3):516-24; 15. Dempsey PC, et al. *Curr Diab Rep*. 2016;16(11):114; 16. Francois ME, et al. *Diabetologia*. 2014; 57(7):1437-45; 17. Colberg SR, et al. *J Am Med Dir Assoc*. 2009; 10(6):394-7; 18. Mesarwi O, et al. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2013; 42(3):617-34; 19. Donga E, et al. *J Clin Endocrinol Metab*. 2010; 95(6):2963-8; 20. Antza C, et al. *J Endocrinol*. 2021; 252(2):125-141; 21. Koren D, et al. *Metabolism*. 2018; 84:67-75.

14

## Terminologie et définition de Diabète Canada

- › Rémission du diabète de type 2 : pas de traitement anti-hyperglycémiants pendant au moins 3 mois consécutifs et atteinte d'un seuil d'A1C tel que défini ci-dessous.

Catégories de rémission :

- › A1C <6.0% : rémission à un taux de glucose normal
- › A1C 6.0% à 6.4% : rémission vers le prédiabète
- › Rechute du diabète de type 2 (A1C ultérieur  $\geq 6.5\%$ )

15

## Critères favorables à une rémission du diabète de type 2

La rémission du diabète de type 2 est possible pour certaines personnes: obtention d'un taux d'A1C dans l'intervalle de non-diabète après l'arrêt des médicaments anti-hyperglycémiants .

La rémission est plus probable pour les individus :

- › diagnostiqués avec un diabète de type 2 depuis peu de temps (< de 6 ans)
- › qui souffrent de surpoids ou d'obésité et qui sont capables et désireux de perdre du poids
- › dont la glycémie n'est pas trop élevée
- › qui ne prennent pas d'insuline

L'arrêt de certains médicaments anti-hyperglycémiants dont les effets bénéfiques sur la réduction des complications cardiaques et/ou rénales ont été démontrés, peut ne pas être recommandé aux personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires et/ou rénales.

16

## Discussions sur la rémission du diabète de type 2

### Conseils de gestion

#### Les trois options suivantes sont les plus probantes en matière de rémission :

1. Chirurgie Bariatrique → Référer à un programme de chirurgie bariatrique
2. Diète hypocalorique supervisée et augmentation de l'activité physique pour le maintien de la perte de poids
3. Programme d'exercices structurés (240 à 420 min/semaine réparties sur 5 jours par semaine) combiné à un régime alimentaire pauvre en calories.


Envisager de référer le patient vers une équipe de soins du diabète (les soins doivent inclure la réduction ou l'arrêt en temps voulu des médicaments antihyperglycémants existants).

- Soutenir la capacité, l'opportunité et la motivation de l'individu à changer, en s'appuyant sur des preuves de changement de comportement.
- L'effort peut ne pas aboutir au résultat escompté (c'est-à-dire la rémission). Le poids et la capacité à obtenir et à maintenir une rémission ne doivent pas être assimilés à l'estime de soi.

Source : Can J Diabetes 46 (2022) 762-774

17

## Lignes directrices: Ajuster ou intensifier le traitement du diabète de type 2




D'après L. Lipscombe et al. Can J Diabetes 44 (2020) 575-591

\* Des changements dans l'état clinique peuvent nécessiter un ajustement des cibles glycémiques et/ou l'arrêt du traitement; + Tabagisme; dyslipidémie (utilisation d'un agent modifiant les lipides ou taux de cholestérol des lipoprotéines de base densité [CLDL] confirmé, non traité  $\geq 3,4$  mmol/L ou taux de cholestérol des lipoprotéines de haute densité [HDL] confirmé, non traité  $\geq 2,3$  mmol/L); — Indiquer si les antihyperglycémiants sont associés à des données probantes de catégorie A en ce qui concerne leur efficacité à réduire la glycémie. \*\*\* Indiquer si les antihyperglycémiants sont associés à des données probantes de catégorie A en ce qui concerne le degré d'hyperglycémie, les coûts et le remboursement, la tolérance, la fonction rénale, les infections concomitantes, le profil des effets secondaires et la possibilité de grossesse.

\*\* Dans le cadre des études sur les effets CV menées chez des personnes atteintes d'une maladie cardiovaskulaire atheroscléreuse (MCVA), d'une néphropathie chronique (NC) ou d'insuffisance cardiaque (IC) ou présentant un risque CV élevé; \*\*\* L'étude VERTIS (étude sur les effets CV de l'ertugliflozine), dont les résultats ont été présentés lors du congrès de l'American Diabetes Association (ADA) en juin 2020, a montré la non-inéficacité de l'ertugliflozine pour ce qui est des événements cardiovaskulaires majeurs (ECV). Article non publié au moment de la rédaction.

18

## La gestion multidimensionnelle du DT2 est approuvée par Diabète Canada (mise à jour des lignes directrices de 2024)



19  
19

## Objectifs de perte de poids

Les lignes directrices thérapeutiques du Canada tiennent compte des objectifs de glycémie ( $\leq 7,0\%$ ) et de perte de poids (5 % - 15 %) dans la prise en charge du DT2<sup>1-3</sup>.

**5% - 10%**

### Recommandations de Diabète Canada

« ... une perte de 5 % à 10 % du poids corporel initial peut améliorer la sensibilité à l'insuline, la maîtrise de la glycémie et la tension artérielle. »

**7% - 15%**

### Recommandations d'Obésité Canada


« Les adultes vivant avec l'obésité et atteints de diabète de type 2 devraient envisager de modifier radicalement leur hygiène de vie et viser une perte de poids de 7 % à 15 % pour favoriser la rémission du diabète et réduire l'incidence de la néphropathie, de l'AOS et de la dépression. »

AOS : apnée obstructive du sommeil

1. Imran et al. *Can J Diabetes* 2018;42 Suppl 1:S42-S46;
2. Wharton et al. *Can J Diabetes* 2018;42 Suppl 1:S124-S129;
3. Wharton et al. *CMAJ* 2020; 192 (31) E875-E891;


20

## Recommandations relatives au traitement antihyperglycémiant chez les patients atteints de DT2 ; Rapport consensuel de l'ADA/EASD de 2022



21


## Recommandations relatives au traitement antihyperglycémiant chez les patients atteints de DT2 ; Rapport consensuel de l'ADA/EASD de 2022



22

## Gestion du poids : Reconnue par les experts comme un élément fondamental des soins dans le cas du diabète

Selon un rapport consensuel sur le traitement de l'hyperglycémie publié par l'American Diabetes Association (ADA) et la European Association for the Study of Diabetes (EASD) en 2022 :



D'après Davies M. J. , et coll. Diabetologia. 2022 : 65(12):1925-66.

23


## Messages clés – Diabète type 2 de Novo (âge moyen)

- Il y a possibilité de rémission du diabète avec modifications de mode de vie soutenues surtout tôt dans le diagnostic du diabète
- La perte de poids est considérée un élément fondamental des soins dans le cas du diabète de type 2
- Pharmacothérapie à privilégier est celle qui mène à une perte de poids, notamment agonistes GLP1 ou agonistes GIP/GLP1 ou iSGLT2

24



MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA



## Michel, 65 ans: diabète et obésité

25

### CAS CLINIQUE : Michel, le fils, 65 ans



#### Diabète de type 2 depuis 10 ans

- › Obésité de longue date malgré de nombreuses visites à une nutritionniste.
- › Il a récemment rencontré un spécialiste qui lui a suggéré de perdre du poids pour du « gras sur le foie ». Il ne comprend pas car il ne boit pas d'alcool.
- › Il fait un peu d'exercice depuis une angioplastie coronarienne il y a 3 ans.
- › Son diabète « ne va pas si mal » avec de la metformine 850 mg bid et gliclazide MR 30 mg die.

26

## CAS CLINIQUE : Michel, le fils, 65 ans



### Évaluation clinique

- › 107 kilos, IMC 38.2
- › TA 123/78
- › Obésité viscérale, hépatomégalie légère
- › Réduction de la vibration aux membres inférieurs
- › TA 123/78
- › A1c 7.4%, ALT 78
- › LDL 1.3 mmol/L, fonction rénale normale

27

## Q5. VRAI OU FAUX

### La stéatose hépatique

#### VRAI OU FAUX

Est une cause majeure de cirrhose

Affecte environ 5% des canadiens

Est associée au syndrome métabolique

N'est pas améliorée par une perte de poids

Peut être évaluée par le score FIB-4

Doit être traitée par de l'insuline

28

## Q5. VRAI OU FAUX

### — La stéatose hépatique

	VRAI OU FAUX
Est une cause majeure de cirrhose	VRAI
Affecte environ 5% des canadiens	FAUX
Est associée au syndrome métabolique	VRAI
N'est pas améliorée par une perte de poids	FAUX
Peut être évaluée par le score FIB-4	VRAI
Doit être traitée par de l'insuline	FAUX

Source: Canadian Liver Journal 5.1 2022

29

## Q6. Quel serait votre prochain geste clinique?



A

Référer Michel à une diététiste

B

Augmenter le gliclazide MR à 60 mg

C

Ajouter de la pioglitazone 30 mg die

D

Débuter un agoniste GLP-1/GIP ou agoniste du GLP-1

E

Débuter un inhibiteur du SGLT-2

Source: Canadian Liver Journal 5.1 2022

30

## Q6. Quel serait votre prochain geste clinique?



**A**

Référer Michel à une diététiste

**B**

Augmenter le gliclazide MR à 60 mg

**C**

Ajouter de la pioglitazone 30 mg die

**D**

Débuter un agoniste GLP-1/GIP ou agoniste du GLP-1


**E**

Débuter un inhibiteur du SGLT-2

Source: Canadian Liver Journal 5.1 2022

31


## Quelle est la perte de poids nécessaire pour améliorer les complications liées à l'obésité?



32

## Un nouvel agoniste des récepteurs du GLP-1 et du GIP

Le GLP-1 et le GIP sont des hormones incrétines qui jouent un rôle dans la régulation de la santé métabolique<sup>1</sup>




Un agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1 est une molécule qui se lie autant aux récepteurs du GLP-1 qu'aux récepteurs du GIP<sup>2</sup>

Le tirzépatide est le premier agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1 à être approuvé au Canada<sup>3</sup>

GIP, peptide insulinoépendant du glucose; GIPR, récepteur du peptide insulinoépendant du glucose; GLP-1, peptide-1 apparenté au glucagon; GLP-1R, récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon.  
 1. Drucker DJ, et al. *Diabetologia*. 2023;66(10):1765-79; 2. Skow MA, et al. *Diabetes Obes Metab*. 2016;18(9):847-54;  
 3. Monographie de <sup>®</sup>MOUNJARO<sup>®</sup>. Eli Lilly Canada Inc. 1<sup>er</sup> novembre 2023.

## Études SUSTAIN: Sémaglutide et HbA1c




\* p < 0,0001 p/r au comparateur; \*\* p < 0,01 p/r au comparateur; † p < 0,01, sémaglutide à 0,5 mg p/r au dulaglutide à 0,75 mg; ‡ p < 0,001, sémaglutide à 1,0 mg p/r au dulaglutide à 1,5 mg

Méthodologie statistique décrite dans les notes du conférencier.

DPP-4 : dipeptidyl peptidase-4; DT2 : diabète de type 2; Dula : dulaglutide; HbA<sub>1c</sub> : hémostoglobine glyquée; LP : libération prolongée; MAO : médicament antidiabétique oral; MET : metformine; SU : sulfonylurée; TZD : thiazolidinédone  
 Références d'origine : 1. Ahren B, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2017;5:341-54; 2. Ahmann AJ, et al. *Diabetes Care*. 2018;41:258-66; 3. Aroda VR, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2017;5:355-66;  
 4. Reddick HW, et al. *J Clin Endocrinol Metab*. 2018;103(6):2291-301; 5. Pratley R, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2018;6:275-86; 6. Zinman B, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2019;7(5):356-367. 7. Frias et al., *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2021 Sep;9(9):563-574.


Illustration composite d'après Novo Nordisk Canada. Monographie de <sup>®</sup>OZEMICO<sup>®</sup>. 15 mars 2024.

## SURPASS-1 à SURPASS-6 : Tirzepatide et HbA1c



\* Tous statistiquement significatifs par rapport au comparateur, réalisés pour la variable d'efficacité AHO, antihyperglycémiant oral, f.p.j., pris par jour. HbA<sub>1c</sub>, hémostoglobine glyquée; iSGLT-2, inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2; SU, sulfonylurée; TZP, tirzépatide. 1. Rosenstock J, et al. Lancet. 2021; 398(10295):143-55; 2. Frias JP, et al. N Engl J Med. 2021;385(6):503-15; 3. Ludvik B, et al. Lancet. 2021;398(10300):583-98; 4. Del Prato S, et al. Lancet. 2021;398(10313):1811-24; 5. Dahl D, et al. JAMA. 2022;327(6):534-45; 6. Rosenstock J, et al. JAMA. 2023;330(17):1631-40.

## Etudes SUSTAIN: Sémaglutide et poids




La monographie n'indique pas la signification statistique de ces analyses; dans les études initiales, selon une méthodologie différente, toutes les comparaisons avaient une valeur  $p < 0,05$  par rapport au comparateur; la méthodologie statistique est décrite dans les notes du conférencier.

DT2 : diabète de type 2; GLP-1 : peptide-1 apparenté au glucagon; HbA<sub>1c</sub> : hémostoglobine glyquée; LP : libération prolongée; MAO : médicament antidiabétique oral; MET : metformine; SU : sulfonylurée; TZD : thiazolidinédone  
Références d'origine : 1. Ahren B, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:341-54; 2. Ahmann AJ, et al. Diabetes Care. 2018;41:258-66; 3. Aroda VR, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(5):355-66; 4. Rodbard HW, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(6):2291-301; 5. Pratley R, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6:275-86; 6. Zinman B, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(5):356-367. 7. Frias et al., Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Sep;9(9):563-574.

Illustration composite d'après Novo Nordisk Canada. Monographie de OZEMPIC®. 15 mars 2024.

## SURPASS-1 à SURPASS-6 : Tirzepatide et poids



## La perte de poids est essentielle pour la SHNA

- Traitements antidiabétiques suggérés (*non approuvés pour la SHNA*)
- Agonistes GLP-1
- Inhibiteurs du SGLT-2
- Pioglitazone
- Tirzepatide

SHNA : steatohepatique non alcoolique  
MASH/NASH : steatohepatique associé à un dysfonctionnement métabolique

## Tirzepatide for Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis with Liver Fibrosis

**Authors:** Rohit Loomba, M.D. , Mark L. Hartman, M.D., Eric J. Lawitz, M.D., Raj Vuppulanchi, M.D., Jérôme Bours M.D., Ph.D., Elisabetta Bugianesi, M.D., Ph.D., Masato Yoneda, M.D., Ph.D., , for the SYNERGY-NASH Investigators\*  Author Info & Affiliations


Published June 8, 2024 | N Engl J Med 2024;391:299-310 | DOI: 10.1056/NEJMoa2401943 | VOL. 391 NO. 4

### Critères d'inclusion

Adultes âgés de 18 à 80 ans


IMC  $\geq 27$  kg/m<sup>2</sup> et  $\leq 50$  kg/m<sup>2</sup> avec ou sans DT2

Diagnostic de MASH, de fibrose F2-3 et de NAS de  $\geq 4$ , avec point  $\geq 1$  pour la stéatose, le ballonnement et l'inflammation lobulaire




## CRITÈRE PRINCIPAL : Résolution du MASH et absence d'aggravation de la fibrose

### Estimand du schéma thérapeutique



### Estimand d'efficacité



Les données sont des estimations ; les différences de risque avec IC à 95 % sont présentées. Les IC ne sont pas ajustés pour comparaisons multiples et ne doivent pas être utilisés pour inférer des effets définitifs du traitement. Les estimations de proportions et de différences de risque sont issues d'un modèle de régression logistique. Pour l'estimand d'efficacité, 155 participants ont complété le traitement et disposaient de biopsies hépatiques évaluables en fin de traitement.

MASH = stéatohépatite métabolique dysfonctionnelle ; N = nombre de participants dans la population analysée.

Source : Loomba R et al., N Engl J Med. 2024 Jun 8. doi: 10.1056/NEJMoa2401943

40

## CAS CLINIQUE : Michel, le fils, 65 ans



### Ajout de tirzépatide 15 mg sc q 7 jours, il a cessé gliclazide MR

- › Poids diminué à 95 kilos
- › ALT 44
- › A1c 6.2%
- › Il se plaint de nausées inconfortables
- › Il se demande s'il a une protection cardiovasculaire optimale

41


## Tirzépatide : Effets indésirables les plus courants

- › Les effets indésirables les plus fréquemment signalés au cours des études cliniques étaient de nature gastro-intestinale, y compris les nausées, la diarrhée et les vomissements
- › En général, ces effets étaient d'intensité légère ou modérée
- › Les effets indésirables de nature gastro-intestinale (4,2 %) ont été les raisons les plus fréquentes de l'abandon du traitement
- › Cas rapportés: pancréatites, rétinopathie diabétique, cholécystites

Monographie de PrMOUNJARO®. Eli Lilly Canada Inc. 1er novembre 2023.

42

## La gestion multidimensionnelle du DT2 est approuvée par Diabète Canada (mise à jour des lignes directrices de 2024)



43  
43

## Tirzépatide et protection cardiovasculaire: SURPASS-CVOT<sup>1,2</sup>


### Sujets (N = 12 500) :

- › DT2
- › MCV confirmée
- › Taux d'HbA<sub>1c</sub> ≥ 7,0 % et ≤ 10,5 %
- › IMC ≥ 25 kg/m<sup>2</sup>
- › Aucun événement CV majeur au cours des 60 derniers jours ni traitement de revascularisation prévu
- › **Interventions:** Dulaglutide (AR GLP-1 avec une protection CV éprouvée<sup>3</sup>) ou tirzépatide
- › **Paramètre d'évaluation principal:** Temps écoulé avant un décès d'origine CV, un IM ou un AVC

AR GLP-1, agoniste des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon; CV, cardiovasculaire; CVOT, cardiovascular outcome trial (étude sur les effets cardiovasculaires); DT2, diabète de type 2; EECV, étude sur les effets cardiovasculaires; HbA<sub>1c</sub>, hémostoglobine glyquée; IC, intervalle de confiance; IM, infarctus du myocarde; IMC, indice de masse corporelle; MCV, maladie cardiovasculaire; MCV, étude sur les paramètres cardiovasculaires. Nicholls SJ, et al. Am Heart J. 2023;267:1-11; 2. Identifiant de ClinicalTrials.gov : NCT04255433; 3. Gerstein HC, et al. Lancet. 2019;394(10193):121-130.


## Plan de l'étude

Étude axée sur la survenue d'événements, à répartition aléatoire, à double insu, avec comparateur actif et avec groupes parallèles



## Le tirzépatide a entraîné un taux d'ECVM-3 non inférieur par rapport au dulaglutide

Paramètre d'évaluation principal



Le tirzépatide démontre des résultats cohérents pour les trois composantes du critère d'évaluation composite ECVM-3

<sup>a</sup> Analyse du temps écouté avant le premier événement à l'aide du modèle des risques proportionnels de Cox. <sup>b</sup> IC à 95,3 % déclaré en raison du taux d'erreur de type 1 ajusté pour l'analyse intermédiaire de l'efficacité. <sup>c</sup> Limite de signification statistique de la non-infériorité < 1,05.

AVC : accident vasculaire cérébral; CV : cardiovasculaire; ECVM-3 : événement cardiovasculaire majeur à 3 points; EECV : étude sur les événements cardiovasculaires; IC : intervalle de confiance; IM : infarctus du myocarde.

<https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/trulicityr-dulaglutide-demonstrates-superiority-reduction> (consulté le 31 juillet 2025).


Information confidentielle de l'entreprise.  
© 2025 Eli Lilly and Company

## TZP vs PBO : Réduction estimée du risque CV

Il s'agit d'une étude à comparateur actif<sup>1</sup>

La limite supérieure de l'IC pour le RR de 0,92 vs dulaglutide est de 1,01<sup>1</sup>; en deçà de la limite de 1,05 définie par la FDA pour l'effet cardioprotecteur<sup>2</sup>. Elle confirme également la supériorité du TZP par rapport au PBO putatif<sup>1</sup>

Une analyse comparative indirecte prédéfinie des données sur les patients appariés tirées des études REWIND et SURPASS-CVOT a révélé que le TZP réduisait les risques suivants<sup>1</sup> :



Remarque : Cette analyse exploratoire des cohortes d'études appariées au niveau des patients ne peut remplacer les données de comparaison directe de l'étude contrôlée à répartition aléatoire.


CV : cardiovasculaire; EECV : essai sur les événements cardiovasculaires; IC : intervalle de confiance; ECVM-3 : événement cardiovasculaire majeur à 3 points; FDA : Food and Drug Administration des États-Unis; PBO : placebo; RR : rapport de risque; TZP : tirzépatide.

1. <https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/trulicityr-dulaglutide-demonstrates-superiority-reduction> (consulté le 31 juillet 2025). 2. Nicholls SJ, et al. *Am Heart J*. 2024;267:1-11.

Information confidentielle de l'entreprise. © 2025 Eli Lilly and Company. 47

## Gestion du poids : Reconnue par les experts comme un élément fondamental des soins dans le cas du diabète

Selon un rapport consensuel sur le traitement de l'hyperglycémie publié par l'American Diabetes Association (ADA) et la European Association for the Study of Diabetes (EASD) en 2022 :



D'après Davies M. J. , et coll. *Diabetologia*. 2022 : 65(12):1925-66.

48

## MESSAGES CLÉS – Diabète et obésité (âge avancé)

- La stéatose hépatique est associée au diabète et à l'obésité
- La perte de poids est la pierre angulaire du traitement
- Seuls la pioglitazone et le sémaglutide sous-cutané ont des recommandations officielles pour la fibrose liée au MASLD.
- Les agonistes GLP-1/GIP PR ne sont pas encore inclus dans le chapitre de Diabète Canada sur le MASLD chez les patients atteints de diabète de type 2.
- Les inhibiteurs du SGLT-2 et les agonistes du GLP-1 sont les agents de choix pour la protection cardio-rénale



MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA

VOUS POUVEZ ÉVALUER ET  
TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION  
EN SUIVANT CE QR





MÉDECINS  
FRANCOPHONES  
DU CANADA

**MERCI**  
**de votre attention**

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions

